

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS DES PASTILLES BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Belivair MAL DE GORGE, pastilles à sucer, est un dispositif médical recommandé dans le traitement des maux de gorge associés à une pharyngite ou une laryngite. Ces pastilles agissent sur les symptômes tels que la douleur, la toux, l'enrouement, l'inconfort lors de la déglutition et les sensations de brûlure et de sécheresse ainsi que les irritations des voies respiratoires supérieures.

Grâce à la combinaison des ingrédients naturels contenant des polysaccharides (*Grand plantain, Erysimum et Réglisse*), les pastilles Belivair MAL DE GORGE :

- Créent une barrière protectrice face aux agents irritants extérieurs (*froid, fumée, pollution, poussière...*) grâce à la formation d'un gel mucoadhésif.
- Soulagent la gorge douloureuse.
- Apaisent la muqueuse irritée grâce aux extraits d'Erysimum.

QUELLE EST LA COMPOSITION DES PASTILLES BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Extraits secs de Grand plantain, extraits aqueux d'Erysimum officinale, extraits secs de Réglisse, menthol, poudre d'anis étoilé, resvératrol, extraits secs de menthe, xylitol, arôme de menthe, stéarate de magnésium végétal, gomme de karaya, sucralose, dioxyde de silicium, acésulfame K.

COMMENT UTILISER LES PASTILLES BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Adultes et enfants de plus de 6 ans : jusqu'à 3 pastilles par jour.

Faire fondre lentement la pastille dans la bouche.

Ne pas croquer. L'utilisation chez les enfants de 6 à 12 ans est conseillée uniquement après avis médical.

Disponible également sous forme d'un collutoire : Belivair MAL DE GORGE Collutoire.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS DES PASTILLES BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Aucun effet secondaire causé par le produit n'est connu.

En cas d'effets secondaires inattendus, arrêter le traitement et consulter un médecin.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

À ce jour, il n'y a pas d'interactions spécifiques connues avec les médicaments et compléments alimentaires.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, avec ou sans ordonnance ou un complément alimentaire, demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.

COMMENT CONSERVER LES PASTILLES BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Conserver le produit à température ambiante (<25°C), dans un endroit sec et à l'écart des sources de chaleur ou de la lumière directe.

Ne pas utiliser en cas de produit endommagé.

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

La date de péremption fait référence au produit dans son emballage d'origine lorsqu'il est stocké dans des conditions appropriées.

Ne pas jeter le produit ou son emballage dans l'environnement.

Le dispositif médical périmé doit être éliminé conformément au règlement de gestion des déchets locaux.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DES PASTILLES BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Utiliser chez les enfants de 6 à 12 ans seulement après avis médical.

Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Ne pas utiliser en cas d'intolérance au produit ou en cas d'hypersensibilité connue aux composants (réglisse, anis étoilé).

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Chaque comprimé doit être uniquement ouvert au moment de l'utilisation.

Le mal de gorge peut être le symptôme d'une infection.

Si les symptômes persistent ou dès que la fièvre est présente, consulter un médecin.

En cas d'utilisation prolongée du produit (plus de 30 jours), il est recommandé d'interrompre le traitement pendant au moins 3-5 jours.

Boîte de 24 pastilles à sucer

Dispositif médical de classe I

Dernière révision : Mars 2016



Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Italie

DISTRIBUTEUR :

Therabel Lucien Pharma

19 rue Alphonse de Neuville

75017 Paris - France



THERABEL