

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS DU COLLUTOIRE BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Le collutoire Belivair MAL DE GORGE est un dispositif médical recommandé dans le traitement des maux de gorge associés à une pharyngite ou une laryngite. Il agit sur les symptômes tels que la douleur, la toux, l'enrouement, l'inconfort lors de la déglutition et les sensations de brûlure et de sécheresse ainsi que les irritations des voies respiratoires supérieures.

Grâce à la combinaison des ingrédients naturels contenant des polysaccharides (*Grand plantain*, *Erysimum* et *Régliſſe*), le collutoire Belivair MAL DE GORGE :

- Crée une barrière protectrice face aux agents irritants extérieurs (*froid, fumée, pollution, poussière...*) grâce à la formation d'un gel mucoadhésif.
- Soulage la gorge douloureuse.
- Apaise la muqueuse irritée grâce aux extraits d'Erysimum.

QUELLE EST LA COMPOSITION DU COLLUTOIRE BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Eau, fructose, alcool, extraits hydro glycinés de Grand plantain, extraits hydro alcoolique d'Erysimum officinale, extrait sec de réglisse, hyaluronate de sodium, huile essentielle de menthe poivrée, menthol, huile d'anis.

COMMENT UTILISER LE COLLUTOIRE BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Le collutoire permet une action localisée du produit sur les parois de la gorge.

CONSEILS D'UTILISATION

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans.

3 pulvérisations jusqu'à 3 fois par jour.

Si les symptômes persistent au-delà de 7 jours pendant l'utilisation du produit, consultez votre médecin.

Disponible également sous forme de pastilles à sucer : Belivair MAL DE GORGE pastilles à sucer, utilisable dès 6 ans.

MODE D'EMPLOI

Lors de la première utilisation, amorcer la pompe par pressions successives sur le capuchon jusqu'à la sortie du produit.

1. Bien agiter le collutoire avant emploi.

2. Faire pivoter la tige articulée pour la mettre en position horizontale.

3. Placer la tige à l'intérieur de la bouche en direction de la partie supérieure de la gorge.

4. Exercer 2 à 3 pulvérisations de façon à tapisser le produit sur les parois de la gorge.

5. Nettoyer l'embout et ranger le produit dans son emballage d'origine.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS DU COLLUTOIRE BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Aucun effet secondaire causé par le produit n'est connu.

En cas d'effets secondaires inattendus, arrêter le traitement et consulter un médecin.

COMMENT CONSERVER LE COLLUTOIRE BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Conserver le produit entre 8°C et 25°C, dans un endroit sec et à l'écart des sources de chaleur ou de la lumière directe.

Ne pas utiliser en cas de produit endommagé.

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

La date de péremption fait référence au produit dans son emballage d'origine lorsqu'il est stocké dans des conditions appropriées.

Ne pas utiliser 3 mois après ouverture.

Ne pas jeter le produit ou son emballage dans l'environnement.

Le dispositif médical périmé doit être éliminé conformément au règlement de gestion des déchets locaux.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DU COLLUTOIRE BELIVAIR MAL DE GORGE ?

Tenir hors de portée des enfants.

Le collutoire Belivair MAL DE GORGE contient de l'alcool.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.

Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Ne pas utiliser en cas d'intolérance au produit ou en cas d'hypersensibilité connue aux composants (réglisse et fructose).

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Le mal de gorge peut être le symptôme d'une infection.

Si les symptômes persistent ou dès que la fièvre est présente, consulter un médecin.

En cas d'utilisation prolongée du produit (plus de 30 jours), il est recommandé d'interrompre le traitement pendant au moins 3-5 jours.

Collutoire 20 ml 

Dispositif médical de classe I

Dernière révision : Mars 2016

 SIIT srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Italie

DISTRIBUTEUR :

Therabel Lucien Pharma

19 rue Alphonse de Neuville

75017 Paris - France

