

# Diastil®

## Diarrhée

### UTILISATION PRÉVUE

Diastil® Diarrhée est un dispositif médical formulé pour restaurer les fonctions physiologiques de la paroi intestinale, en vue de contrôler et réduire les symptômes de la diarrhée, quelle que soit son origine (*fréquences des selles, tension abdominale*). Diastil® Diarrhée est une combinaison de xyloglucane et de gélatine formant un film protecteur sur la muqueuse intestinale.

Diastil® Diarrhée réduit ainsi la fréquence et la durée de la diarrhée.

### PRÉSENTATIONS

- Dix sachets contenant de la poudre pour les enfants de moins de 14 ans.
- Un blister contenant 10 gélules pour les adultes et les enfants de plus de 14 ans.

### COMPOSITION

**Diastil® Diarrhée sachet :** Combinaison de xyloglucane et de gélatine (*origine porcine*), maltodextrine, acide citrique, chlorure de sodium, sucralose et arômes de fraise et de vanille.

**Diastil® Diarrhée gélule :** Combinaison de xyloglucane et de gélatine (*origine porcine*), amidon de maïs, stéarate de magnésium (*origine végétale*).

### MODE D'EMPLOI

**Diastil® Diarrhée sachet :** Voie orale. Dissoudre le contenu d'un sachet dans un demi verre d'eau ou dans une petite quantité de lait, de jus de fruit ou de yaourt. Bien mélanger et administrer immédiatement.

**Diastil® Diarrhée gélule :** Voie orale. Avaler la gélule avec de l'eau.

### POSOLOGIE

- **Enfants de moins de 3 ans :**  
1 sachet toutes les 8 heures.
- **Enfants âgés de 3 à 14 ans :**  
1 à 2 sachets toutes les 6 à 8 heures.
- **Adultes et enfants de plus de 14 ans :**  
1 à 2 gélules toutes les 6 à 8 heures.

### AVERTISSEMENTS

- Ce produit peut être utilisé sans consulter un professionnel de santé. Cependant, si les symptômes persistent, s'aggravent ou s'il existe des doutes quant au diagnostic, il est conseillé de consulter.
- En cas de diarrhée, chez les enfants de moins de 3 ans ou chez les personnes âgées, il est recommandé de consulter un professionnel de santé, en particulier si d'autres symptômes sont présents.
- Ce dispositif médical ne constitue pas un traitement pharmacologique. Si un professionnel de santé vous en recommande un, ce dispositif médical peut être administré simultanément.
- En cas de diarrhée, il est recommandé de s'hydrater abondamment et d'adapter son alimentation.
- Bien qu'aucun effet indésirable ne soit connu, il est recommandé de ne pas utiliser ce produit pendant la grossesse ou l'allaitement, sauf indication contraire d'un professionnel de santé.
- Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption ou si le blister ou le sachet est ouvert ou endommagé.
- Ce dispositif médical ne requiert aucune condition de conservation particulière. Ne pas congeler.
- Tenir hors de portée des enfants.

### CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser ce produit en cas d'hypersensibilité au xyloglucane, à la gélatine, ou tout autre composant du produit.

 NOVENTURE, S.L.  
Avenida Diagonal, 549, 5a planta  
08029 Barcelona - Espagne

**Distributeur :** Laboratoire Therabel  
19 rue Alphonse de Neuville - 75017 Paris - France  
Tel : 01 44 40 57 00 - [vigilance.tlp@therabel.com](mailto:vigilance.tlp@therabel.com)

Dispositif médical de Classe III

 0373



Dernière révision : Janvier 2020

**THERABEL** 